

經

效

產

寶

婺源張君金城近購得日本所刻唐
節度隨軍管殷撰集經效產寶書版
隨以印本眎余余讀其書凡上中下三卷
後附續編一卷書中著預作著藥避
唐諱而不避宋諱復攷新唐書藝文志
有博士管商著心鑑五卷或即斯人避殷
作商其為北宋本無疑日本邦人於醫家

舊籍考察最精近如北宋本千金方元大
德本千金翼方顯於澠上影宋本外臺祕
要購自粵東今得是書唐賢撰述豈可
寶貴余家雖習醫苦於蒐藏無多核就
所見書諸卷端玉署方藥之合宜在乎明
哲者取擇焉光緒七年春正月歸安凌德
書於尚素軒

經效產寶卷之上

節度隨軍晉殺撰集

相國白幣家藏善本

○妊娠安胎方論第一凡拾壹道

療妊娠三四月腹痛時時下血

續斷捌分艾葉陸分炒當歸陸分

竹茹肆分干地黄陸分阿膠肆分炙

雞蘇肆分

右以水壹升煎取陸合去滓空心再服隔日更服

治妊娠六七月忽胎動下血腸痛不可忍

芎藭

捌分

桑寄生

肆分

當歸

拾貳分

右以水壹升半煎取捌合下清酒半升同煎
取玖合分作叁服如人行五六里再溫服
治姙娠下血時時漏血血盡子死

生地黃

汁叁合

清酒

叁合

右相和煎三四沸空腹分溫溫服

治姙娠心頭妨蕙兩脇脹不下食

檳榔

叁个

人參

肆分

柴胡

伍分

枳殼

肆分炙

肉豆蔻

貳分

生姜

貳分

桑寄生

肆分

右以水貳升煎取陸合分溫叁服

治妊娠身傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

前胡

陸分

石膏

拾貳分

大青

肆分

子苓

伍分

知母

肆分

山梔

肆分

葱白

柒莖

甜竹如

叁分

右水貳升煎取捌合食後分溫三服

治妊娠胎動腰痛及下血安胎

當歸

肆分

芩藎

肆分

葱白

貳七莖

艾葉

貳分

茅根

陸分

鹿角膠

陸分炙為末

右水貳升煎取捌合空心熱喫三服

治妊娠損動安胎

鯉魚

壹斤

粳米

壹升

右作臍食之佳

治妊娠嘔吐不食兼吐痰水

生芦根拾分橘皮肆分

生姜陸分

檳榔貳分

右以水貳升煎取柒合空腹熱服

治妊娠腸滿腹脹心胃煩見飢即吐漸加羸瘦

赤茯苓

前胡各肆分

小半夏肆分

生姜叁分

白朮壹分

大腹子伍个

麥門冬陸分檳榔伍枚

紫蘇肆分

右水貳升煎取捌合空心分溫叁服

治妊娠常苦煩悶此是子煩宜服此方

伏苓

捌分

防風

陸分

知母

陸分

竹瀝

溫胎

生門冬

拾貳分

右水貳升煎取柒合下竹瀝食後作兩服

治姙娠胎動不安煩悶

當歸

肆分

芎藭

叁分

阿膠

貳分

入

葱白

拾肆莖

豉

捌合

桑寄生

肆分

右水貳升煎取捌合下阿膠空腹分兩服

○姙娠食諸物忌方論第二

凡五道

食雞肉與糯米共食令子生白蟲

食鯉魚及鷄子令子多疳

食羊肝令子多厄

食鴨子令子倒生

食鬼肉犬肉令子缺唇無音声

○益氣滑胎令易產方論第三 凡壹道

潤胎益氣令子易生訶子丸

檳榔

捌分

芫薹

貳分

吳茱萸

叁分

訶子皮

叁分蒸

右爲細末煉蜜爲丸如綠豆大空心酒下十九九二十九自七八个月服至分解

○姙娠惡菹嘔吐不食方論第四 凡四道

論曰夫菹病之候心中潰潰頭眩四肢沉重懈怠惡聞食氣好喫酸鹹果實多卧少起三

月四月多嘔逆肢節不得自舉者以此治之

人參

捌分

厚朴

陸分炙

茯苓

拾叁分

葛根

捌分

白朮

拾貳分

橘皮

陸分

生姜

拾壹分切

右水柒升煮貳合分溫參服忌桃李醋等物

治妊娠三四月嘔吐惡聞食氣

橘皮

青竹如

生姜

茯苓

白朮

各貳兩

右水陸升煎貳升分溫參服忌同前

治妊娠蘊病心中潰悶見食嘔吐憎聞食氣肢節煩疼身躰沉重多卧嗜睡黃瘦方

人參

橘皮各捌分 茯苓拾貳分

生薑拾貳分 甘草拾貳分 大棗拾貳枚

生麥門冬子去心拾分

右水伍升煎取貳升分溫參服忌菰菜醋等
凡妊娘惡食者以所思食任意食之必愈

○胎動不安方論第五 凡十八道

論曰安胎有二法因母病以動胎但療母疾其
胎自安又緣胎有不堅故致動以病母但療胎
則母瘥其理甚效不可違也胎不動不知子死
生者但看母唇口青者兒死母活口中青沫出
者子母俱死口舌赤青沫者母死子活也

療胎數落而不結實或冷或熱

甘草

參兩

黃耆

人參

白朮

芎藭

乾地黄

吳茱萸

各貳兩

右爲末空腹酒調貳錢忌菰菜醋等物

治胎動不安

好銀

煮取水

右着葱白作羹食之佳

治胎動下血心腹絞痛兒在腹死活未分服此藥死即下活即安極妙

當歸

參兩

芎藭

陸兩

右水四升酒參升煮取參升爲三服

治妊娠三二月及七八月胎動不安或腰肚痛有血下

芎藭

當歸各肆兩

艾葉貳兩

甘草

壹兩

阿膠

貳兩炙

右水五升煮取二升分溫三服

古方无艾葉

治妊娠搶心下血不止腰腹痛不可忍

上銀

壹斤水壹斗煎取柒升

芎藭

肆兩

當歸

肆兩

阿膠

叁兩

生地黄

伍兩

右以前銀水煮取二升分三服

治妊娠无故胎動不安腹內絞痛

葱白

切壹升

阿膠

叁兩炙

當歸

四兩

川芎

四兩

桑寄生

右取銀水柒升煮藥取貳升半分三服

治姙娠五六月胎猶不安不常處

白朮

叁兩

厚朴

貳兩

旋復花

壹兩

黃芩

貳兩

茯苓

叁兩

生薑

貳兩

枳殼

貳兩

芍藥

貳兩炙令黃色

右以水柒升煮取貳升半分食後分溫五服

治胎動不安

熟艾

貳兩

葱白

切壹升

阿膠

貳兩炙

右水肆升煮取壹升半分溫兩服

又方

芩藎

貳兩

葱白

切壹升

右水柒升煮取貳升半分溫三服

治姙娠冷熱腹內不調致胎不安

當歸

參兩

乾姜

參兩

芩藎

肆兩

艾葉

貳兩

右水肆升煎取貳升分爲四服

治姙娠經八九个月或胎動不安因用力勞乏
心腹痛面目青冷汗出氣息欲絕由勞動驚胎
之所致也

釣藤

貳兩

伏神

人參

各貳兩

當歸

貳兩

桔梗

叁兩

寄生

壹兩

右水伍升煎取貳升分爲三服忌猪肉菰菜
若煩熱加石膏伍兩臨月加桂心貳兩

治妊娠因夫所動困絕

右取竹瀝飲壹升立愈

療妊娠被驚惱胎向下不安小腹痛連腰下血

當歸

芎藭

各捌分

阿膠

陸分炙

人參

陸分

艾葉

肆分

大棗

拾貳枚

茯苓

拾分

右水肆升煮取貳升分爲三服

治墮胎忽倒地舉動擎促損腹中不安及子死

腹中不出

芩藎 壹兩

右爲末服寸匕須臾三服立出

治胎動衝心煩悶欲死安胎止痛

甘草 炙

當歸

芩藎

人參

阿膠

各貳兩

葱白

切壹升

右以水柒升煎取貳升分爲三服

療妊娠忽黃汁下如膠或如小豆汁

粳米

伍升

黃耆

伍兩

右以水柒升煎取貳升分爲四服

治妊娠胎動欲落肚痛不可忍

上銀壹斤

茅根

去黑皮切貳升

右以水九升煮銀取貳升入清酒壹升同煎
茅根取貳升分爲三服立安

療妊娠腹內冷痛忽胎動

薤白

切壹升

當歸

四兩

右以水五升煎取貳升作三服

〇妊娠漏胞下血方論第六

療漏胎下血不止胞干即死宜急治之

生地黃汁壹升

酒伍合

右同煎三五沸分三服頻喫瘥

治妊娠下血不止血盡子死

生干地黄爲細末

右酒服方寸匕日三服夜一服即愈

治妊娠下血不止及腹內冷者

生地黄 干姜

右兩味等分同煎服

治妊娠無故卒下血止不絕

阿膠炙兩炙

右清酒壹升半煎取壹升頓服

又方

生地黄捌兩

右搗碎以酒浸絞去滓分兩服以止爲度

療妊娠下血如月信來若胞干則損子傷母

干地黄

伍兩

干姜

伍兩

右以水六升煎取二升下蜜少許更煎兩沸
分二服

○妊娠心腹腰痛方論第七 凡十一道

治妊娠二三月腹痛腰痛

當歸

叁兩

阿膠

炙

甘草

各貳兩

葱白

切壹升

右水柒升煮取二升分三服忌猪肉菰菜醋
等物

治妊娠三五月已來忽心腹絞痛

大棗拾肆枚燒令焦

右取小便調服之

治妊娠心腹痛不可忍

鹽壹斤燒令赤

右以兩指取一撮酒調服之

治妊娠遍身痛或衝心欲死不能飲食

白朮伍兩

黃芩貳兩

芍藥肆兩炙

右以水六升煮取二升半爲三服緣胎有水

致痛兼易產

治妊娠卒心痛氣欲絕

芎藭

當歸

茯苓各叁兩

厚朴

炙兩炙

右水陸升煎取貳升分爲兩服忌食如前

治妊娠腰背痛反覆不得

鹿角

壹枚長五六寸燒令赤酒中淬之冷又燒之更碎以角碎爲度

右取酒飲之作散服鹿角亦得

療妊娠先患冷氣忽衝心腹痛如刀刺

芎藭

人參

茯苓

吳茱萸

桔梗

當歸各炙兩

厚朴

芍藥

炙各貳兩

右水玖升煎取參升分三服氣下即瘥

治妊娠患腹痛并胎動不安

葱白

切壹升

人參

厚朴炙

阿膠炙

芎藭各貳兩

當歸叁兩

右水柒升煎取叁升分作三服

治姙娠疼痛不可忍或連胯痛

先服此散

杜仲

肆兩

五加皮

阿膠炙

狗脊

防風

川芎

細辛

芍藥各叁兩

萆薢叁兩

杏仁

捌拾枚去尖

右水玖升煮取貳升去滓下膠作三服

治姙娠三兩月腰痛不可忍者

先服前散後服此丸

續斷

杜仲各拾分

芎藭叁兩

獨活 參兩

狗脊

五加皮

革薢

芍藥

薯藥

呵子 已上各捌兩

右爲末蜜和爲丸吾同子大空心酒下四十
九丸日再服

治觸動胎以致腰痛背痛

杜仲

五加皮

當歸

芍藥

灸

芎藭

人參

革薢

各參兩

右以水柒升煎取貳升半分溫三服

人○妊娠傷寒熱病防損胎方論第八 凡五道

論曰非即之氣傷折妊婦熱毒之氣侵損胞胎
遂有墮胎漏血俱害子母之命

治妊娘傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落

葱白

切壹升

前胡

葛根

石膏

各拾分

青黛

陸分

升麻

捌分

梔子仁

拾貳分

右以水柒升煮取貳升半分三服

治妊娘頭痛壯熱嘔吐不下食心煩熱

青竹如

葛根

知母

各叁兩

芦根

壹升

生麥門冬

肆兩去心

右水柒升煎取叁升分三服

治姙娠時氣頭痛腰背強壯熱

升麻

黛青

前胡

黃芩

山施各貳兩

葛根參兩

石膏捌分

右水五升煎取參升半分為三服

治姙娠婦六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱

前胡拾分

大黃

石膏各貳拾分

梔子仁拾枚

知母

黃芩

茯苓

生姜各捌分

右水捌升煎取貳升半後下大黃更煎三五

沸分作三服

治妊娠傷寒苦熱不止身上斑出忽赤忽黑小便如赤血氣欲絕胎欲落

梔子仁

升麻各肆兩

代黃青貳兩

石膏捌兩碎

葱白切壹升

生地黄貳拾分

黃芩叁兩

右水玖升煎取叁升作三服忌熱物

○妊娠患淋小便不和方論第九凡二道

治妊娠患淋小便澁不利小腹水道熱痛

冬葵子壹升芍藥貳兩炙黃芩

茯苓 車錢子各三兩

右以水柒升煎取貳升分溫三服

○妊娠下痢黃水赤白方論第十 凡七道

論曰妊娠下痢皆因悞食生冷肥膩冷即色白熱即黃赤氣不和赤白相兼撓刺疼痛脾胃不調之所致也

治妊娠患痢膿血狀如魚髓小腹絞痛難忍

薤白 切壹升 地榆 醋榴皮

黃蓮 各叁兩 阿膠 貳兩炙

右水柒升煎取貳升半分三服忌生冷肥膩

治妊娠痢白膿腹內冷

乾姜 肆兩 赤石脂 陸兩 粳米 壹升炒

右水米升煎取貳升分三服忌如前

療妊娠腹痛下痢不止

黃連

石榴皮

當歸各叁兩

阿膠

貳兩炙

艾

壹兩半

右水陸升煎至貳升分爲三服忌如前

療妊娠下痢腹內痛膿血不止

黃連

捌分

厚朴

炙

阿膠

炙

當歸

各陸分

艾葉

黃蘗

各肆分

干姜

伍分

右爲末空心米飲調下壹匙日進三服

療妊娠膝下刺痛大便白晝夜三五十行

根黃

厚者塗蜜炙令焦

大蒜

炮令爛熟

右大蒜去皮研如膏和根黃末爲丸如梧桐子大空心粥飲下三十丸日進三服妙療妊娠痢黃水不絕

厚朴

參兩炙

黃連

貳兩

豆蔻

五枚連皮

右水貳升煮取壹升頻服忌如前

治妊娠忽被驚奔走墮胎下血不止兼痛

乾地黃

肆兩

當歸

艾葉

各貳兩

阿膠

炙

芎

各參兩

右水柒升煮取貳升半分作三服痛加杜仲五加皮各參兩

○治妊娠水氣身腫腹脹方論第十一凡四道
論曰臟氣本弱因產重虛土不尅水血散入四肢遂致腹脹手足面目皆浮腫小便秘澀
治妊娠身腫有水氣心腹脹滿小便少

茯苓

肆兩

杏仁

去尖

檳榔仁

叁兩

旋復花

郁李仁

各壹兩

右水陸升煮取貳升分溫溫服小便通即差
治妊娠四肢皮肉拘急及腫

桑白皮

切貳升

樟桂根

壹兩

赤小豆

貳升

右水壹斗貳升煮二味取柒升下小豆煮令熟先食豆候渴即飲其汁小便利即差

治姙娠遍身洪腫方

亭薤子

拾分

白朮

貳拾分

茯苓

貳兩

桑白皮

貳兩

郁李仁

捌分

右水陸升煎取貳升作兩服小便利即差

又方

澤瀉

叁兩

亭薤子

叁兩

白朮

陸兩

枳殼

炙

茯苓

各陸兩

右制度服食如前

○姙娠千金易產方論第十二

凡六道

論曰夫婦人特將產至重者胞衣也凡胞衣不出者世謂之息胞由產時用力過度已產而身

已瘦頓不能更用氣經停之間而外冷氣乘之
則血澁逆否故令胞衣不出則不得斷臍浴沐
冷氣傷兒則成病也

舊方胞衣不損兒者依法截臍而以物繫其帶
一頭所有產時看生人不用意謹護而率挽胞
系斷其胞上掩心而夭命也凡欲產時必先脫
常所着衣裳以籠竈神驗
胞衣不出方

竈下土 壹大寸研碎

右用好醋調令相和內於臍中續取生甘草
湯三四合服

又方

槐子 拾四枚 蒲黃 壹合

右酒煎溫服須臾未效更進一服

又方

生地黄汁 伍合 生姜汁 半大合

右煎三四沸頓服之

又方

槐子 槐枝切壹升最好 瞿麥 捌分

牛膝 捌分 通草 拾貳分 白榆 切壹大升

冬麻仁 壹大升研

右水伍升煎貳大升去滓下麻仁分三服

小品顏服散令易產母疾病未生一月已前預服過三十日行步不覺兒生

甘草

捌分

粳米

壹合

大豆黃

炒

黃芩

乾姜

桂心

吳茱萸

冬麻仁

研如泥各貳分

右爲末空腹煖酒服方寸匕忌生冷肥膩

又易產方

飛生鳥

壹隻燒

槐子

拾四枚

故箭羽

拾四片

右爲末蜜爲丸○大覺痛服三十九未產須

更再服之

○治產難諸疾方論第十三

凡十二道

易產方

榆白皮拾四分通草拾貳分葵子叁合

滑石

蘘麥各捌分

右水貳升煎取捌合分溫三服

又方

羚羊角壹枚燒刮取末

右以酒調方寸匕服

又方

滑石捌分葵子壹合榆皮拾貳分

牛膝陸分

右水壹升捌合煎取陸合再服

又方

含醋嚙面悶即嚙之

又方

吞槐子柒枚即下

又方

吞鷄子白兩枚即產

又方

兩手各把一石燕立產

又方

兔皮和毛燒灰研

右以酒調兩錢匕即產衣不下服之即下

又方

大麻根參莖

右水壹升煎取半升頓服立產衣不下服之即下

又方

弓弩絃燒灰

右爲末酒調方寸匕服之即下

又方

銅弩牙

右燒赤投於醋三合內良久頓服立產

又方

麝香 壹錢

右研水調服之立產

△○難產死生方論第十四 凡八道

療胎死腹中不出母氣欲絕

水銀 貳兩

右頓吞之兒立出

治產橫倒不出

右令夫唾口中二七遍立出

療產經數日不出或子死腹

蘘麥

陸兩

通草

參兩

桂心

參兩

榆白皮

切壹升

右水玖升煎取三升分三服

又方

蘆麥

右水煮取濃汁服之佳

療子死腹中不出

伏龍肝

爲末 叁錢

右酒調服之土當兒頂上戴出妙

又方

朱砂

壹兩

右水煎數沸然後取酒和服之

又方

水銀貳兩

右水煮二三十沸服之立產

滑胎易產

白蜜

苦酒

猪脂各壹升

右相和煎三四沸臨腹痛時以熱酒調下三四錢匕不過五六服即出

○難產令易產方論第十五 凡七道

論曰夫產難者內宜用藥外宜用法蓋多門救療以取其安也

療產難坐草數日困乏不能生此爲母先有病經絡俱閉所然

赤小豆

貳升

膠參升

右水玖升煎令熟去豆內膠洋令清服之須
臾更一服

又方

右令夫從外含水吐着產婦口中即出
療難產疑胎在腹已死

當歸

肆分

芩蘄

陸分

右水陸升煎取貳升分作兩服便安胎死即
出酒煎亦得神驗

治難產困乏腹痛有所見兒及衣不出

疾藜子

肆兩

貝母

肆兩

右爲末每服壹匙酒調服之時再服以出爲度熟水調下亦得

治難產

箭壹隻燒爲末

右以水調服之

又方

鼈甲燒爲末

右服方寸匕立出未生更服

治療落胎腹痛

芍藥

當歸

牛膝

瞿麥

各伍分

桂心

芒硝

各肆分

右以水壹升柒合煎取捌合空心溫服

○胎死胞衣不出方論第十六 凡十八道

療姙娠經五六月胎死腹中或胞衣不出

生地黄伍兩 牛膝

朴消各捌分

杜心 芩藺

大黃各陸分

蒲黃伍分

右水貳升煎取捌合入蒲黃空心作二服

療子死腹中不出

雄鷄糞貳拾壹枚

右水貳升煎取伍合以米作粥食胎即出

治姙娠經六七月子死腹中不出

黑豆 參合

右醋壹升煎取捌合空心分溫三服
治子死腹中母悶絕

水銀 拾貳分

右取井底土如雞子黃水研服之
又方

赤小豆

右生吞七枚出若是女即二七枚出
經效理胎衣不出令爛

牛膝

瞿麥 各肆兩

滑石 研捌分

當歸 貳兩

通草 陸兩

葵子 壹升

右水伍升煎取貳升分三服溫服

又方

竈突土參攷

右和煖水服之

崔氏治胎胞不出

大豆壹升

右苦酒伍升煮取叁升分爲三服

又方

右吞雞子兩三隻解髮刺喉中令嘔若因熱以水煮螻蛄壹枚三四沸瀉口中汁下即出

又方

大麥

小麥

小豆

右等分相和煮取濃汁飲之出

又方

赤朱 壹兩

右研爲粉以苦酒和服之即出

又方

皂夾

右爲末着鼻中一兩度自出

療胞衣久不出腹滿即殺人服此方即爛

挂心

牛膝

通草 各叁兩

滑石 貳兩

葵子 壹升

瞿麥 肆兩

右水玖升煎取參升分三服甚效

又方

覆麥

肆兩

桂

參兩

通草

參兩

牛膝

伍兩

葵子

壹升

右水參升煎取壹升半分為三服

又方

真珠

壹兩

右研細苦酒調服之

又方

洗兒水

右取半椀服之即出

治胞衣不出

牛膝

捌兩

葵子

貳升

右水柒升煮取叁升分三服

治衣半水半不出或子死腹中着脊不下數日
不產血氣上衝

牛膝

陸兩

葵子

壹升

榆白皮

肆兩

地黄汁

捌合

右水玖升煎取叁升分叁服即出

經效產寶卷之上

經效產寶卷之中

節度隨軍各

相國白幣家藏善本

○產後心驚中風方論第十七凡七道

論曰產後心悶氣絕眼張口噤通身強直腰背反偃狀如癰疾心忪驚悸言語錯亂皆是宿有風毒因產心氣虛弱風因產發成風症

防風當歸伏苓

漢防已麻黃秦膠去節各

人參芎藭獨活

白鮮皮甘草白微炙各陸分

石膏

拾貳分

竹瀝

貳升

右水柒升先煮麻黃掠去沫下諸藥入竹瀝煎取貳升半去滓三服忌葱菜猪肉生冷療產後狂語志意不定精神昏亂心氣虛風邪所致

茯苓

乾地黃

各拾分

遠至

拾分

白微

龍齒

各拾分

甘草

炙

人參

防風

獨活

各捌分

右以銀壹大斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥煎取叁升分溫三服忌如前

療產後心虛忪悸不定亂語謬誤精神恍惚不

主當由心虛所致

人參

甘草炙

芍藥

當歸

生姜各捌分

遠志

茯苓

各拾分

桂心陸分

門冬去心

大棗

各拾貳分

右水捌升煎取參升去滓分溫三服

療產後心氣虛損卒驚強語或歌哭嗔笑性氣不定

上銀

壹斤

桂心

甘草

各陸分

細辛

肆分

人參

生姜

遠志

茯苓

各捌分

生地黃

二十分

龍骨

壹分

大棗

壹枚

右水捌升煮銀取壹升半入諸藥煎分三服
溫溫進

療產後多虛弱羸瘦苦大汗痢皆至於死此重
虛故若患中風謬語昏悶不知人者

人參

茯苓

羌活

桂心

大棗

各拾分

遠志

拾分

竹瀝

壹升半

右水陸升煮取參升下竹瀝更煎取貳升煎
爲三服

療產後身忽痊口噤面青手脚強急

右竹瀝貳升飲之最佳

療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中瘡
生時時乾嘔困乏欲絕

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹如

遠志

各陸分

伏神

捌分

白欬

拾分

玄參

拾貳分

竹瀝

貳升半

右銀壹斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥重
煎取參升分溫三服忌魚酒麵等物

○產後餘血奔心煩悶方論第十八

凡十五道

論曰餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便

并擗心下及卧太疾兼食不相宜之物所致但
能依方療之無不痊可

療產後心中虛熱煩悶氣欲絕

大棗

拾貳分

伏苓

拾貳分

生姜

捌分

甘草

伍分

竹瀝

壹升

人參

陸分發逆方用

粳米

若食小加參合

生麥門冬

貳拾分

右水陸升煎取參升方入竹瀝更煎取兩分

分溫三服

療產後餘血不盡奔衝心煩悶腹痛

生地黃

芎藭

各參兩

枳殼

炙

芍藥

各參兩

右擣篩爲末酒服方寸匕日進二服

又方

生藕

研汁

右飲貳升甚效

又方

清酒

壹升

生地黄汁

壹升

右相和煎一沸分爲兩服

療產後腹內塊痛不止

芎藭

當歸

芍藥

乾姜

各貳兩

右擣羅爲末酒調方寸匕日三服

療產後下血不盡腹內堅痛不可忍

當歸

芍藥

桂心

各參兩

桃仁

壹百貳拾枚

右水陸升煮取貳升分溫二服如未瘥加大黃參兩

療產後血結下不盡腹絞痛不止

大黃

別浸

當歸

乾地黃

各拾分

芍藥

芍藥

桂心

各捌分

甘草

炙

黃芩

各陸分

桃仁

肆拾玖枚

右水柒升煮取貳升半下大黃更煎三沸分爲三服

療先患冷氣因產後發腹痛

芎藭

桂心

當歸

茱萸

伏苓

芍藥

甘草

各陸分

桃仁

拾分去尖

右水柒升煮取貳升分參服

治產後心腹切痛不能食乏氣忽熱

當歸

芎藭

黃芩

人參

甘草

芍藥

防風

生薑

各參分

桃仁

捌拾枚

右水柒升煮取貳升下大黃更煎三沸分作

參服

療產後血不盡腹中除痛無計

青木香

當歸

牛膝

芍

黃耆

芍藥各捌分

大黃

拾叁分浸

芒硝

拾貳分

右水柒升煎取貳升後下大黃更煎三沸分
三服

療產後血下不止虛羸迫死

蒲黃

貳兩

右水貳升煎取捌合頓服

療產後血泄不止無禁度

乾黃末

右酒服匙頭日三四服

療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕

羊血

右以一盞頓服如不定更服立效

療氣痛欲死

槐雞

半兩

右爲末用酒濃煎頓服立愈

療產後餘血作疼痛廉塊者

桂心

姜黃

右等分爲末酒服方寸匕血下盡妙

○產後渴不止方論第十九

凡二道

療產後渴不止飲水小便數多

土瓜根

括婁根

人參

甘草

牡礪粉

各貳兩

大棗

拾貳枚

右水玖升煮取參升分溫三服

療產後大渴不止

蘆根

切壹升

括婁

叁兩

人參

甘草

茯苓

各叁兩

大棗

拾貳枚

生麥門冬

肆兩

右水玖升煮取參升分爲三服頓服四劑即

差忌菰菜

○產後淋病諸方論第二十

凡六道

論曰產後患淋因虛損後有熱氣客於胞中內
虛則起數熱則小便澁痛故謂之淋又有因產
損血氣血氣虛則挾熱熱搏於血血即流滲於
胞中故血隨小便出為血淋者如雨之淋也
療產後淋病小便澁痛或血淋者

瞿麥

黃芩

冬葵子 各貳兩

通草

參兩

大棗

拾貳枚

右水柒升煮取貳升半分作兩服

療產後血淋

車前子

瞿麥

各四兩

黃芩

參兩

鬱金

壹兩末

右水陸升煮取貳升下麝金末分三服

廣濟療產後卒患淋小便躁痛及血淋

冬葵子參合

石葦貳兩炙去毛

通草

黃芩

滑石

伏苓各參兩

右水貳升煎取壹升下滑石空心服

集驗療產後患淋小便痛

石葦

炙去毛

黃芩

各貳兩

通草

芍藥

甘草

冬葵子

各參兩

榆白皮

伍合

右水貳升煎取壹升空心溫溫服

經效療產後氣淋熱淋

貝齒

兩枚燒
作末

葵子

貳兩

石膏

伍兩

陽石

未參兩

右水貳升煎取壹升下兩般末空心服

療產後淋小便痛及血淋

黃茅

伍兩

瞿麥

貳兩

車前子

貳兩

通草

參兩

冬葵子

貳合

鯉魚齒

壹百枚
為末

右水貳升煎取壹升入齒末空心分兩服

○產後虛羸下痢方論第二十一

凡三道

論曰產後本虛患痢更加羸弱飲食不進便痢無常赤白不定蓋因飲食傷於生冷之所致療產後虛羸下痢膿血腹痛

黃連

芍藥

甘草

當歸

乾姜

人參

各八兩

艾葉

參分

右水柴升煮取貳升分爲三服忌猪鹿肉

療產後痢不止困乏氣欲絕無問赤白水穀

黃連

厚朴

各參兩

芍藥

黃檗

各貳兩

右水陸升煮取貳升分爲貳服

療產後痢赤白心腹絞痛羸困

地榆

石榴皮

黃連

各參兩

當歸

貳兩

薤白

切壹升

右水柒升煮取貳升半分為三服

○產後腰痛羸瘦補益玉門不閉方論廿二
療產後少氣困乏虛煩

人參

拾貳分

甘草

桂心

茯苓

芍藥

各捌分

生地黃

生麥門冬

各拾貳分

右水玖升煮取參升分溫三服

療產後喘乏氣羸腹內絞痛白汗出

黃耆

人參

茯苓

甘草

當歸

芍藥

五味子

白朮

各捌分

澤蘭葉

橘皮 各陸分

呵子

麥門冬 各拾貳分

桂心

乾地黄 各拾貳分

右壽羅為散煉蜜和丸如梧同子犬空心酒下三十九日再服

療產後風虛羸弱勞瘦不生肌肉

黃耆

當歸

芍藥

人參 各貳兩

桂心

甘草 炙

芎藭

生姜 各捌分

大棗 拾貳枚

右水柒升煮取參升分溫三服

療產後虛勞骨節疼痛頭疼汗不出

當歸

人參

生姜 各貳分

黃耆 參兩

豉 伍合

粳米 叁合

猪腎 壹對切

薤白 切三合

右水壹斗伍升先煮猪腎取陸升後下諸藥煎至貳升分為三服

又方

猪腎 壹對

右入葱豉作臙如常食之

療產後大虚心腹急痛血氣上搶心氣息乏補益方

黃耆

白朮

當歸

甘草 炙

人參 各貳兩

生姜 四兩

白羊肉

右水壹斗玖升煮肉取伍升後下諸藥更煎取叁升為三服

療產後陰腫下脫肉出玉門閉

石灰

壹斤炒令色黃

右水貳升投灰中停冷澄清重燒以浸玉門斯須平復如故

○產後中風方論第二十三

凡十五道

論曰產後中風由產傷動血氣勞損藏腹未平復起早勞動氣虛而風邪氣乘之故中風風邪令氣客於皮膚經絡但疼痺羸乏不任少氣若

又筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則縱緩弱若入諸藏恍惚驚悸隨其所傷腑臟經絡而生病療產後中風口噤不任小大獨活湯

獨活

肆分

乾姜

陸分

甘草

貳分

生姜

陸分

右水貳大升煎取壹大升分爲兩服

小品大豆湯主產後中風困篤或背強口噤或但煩躁或頭身皆重或身痒劇者嘔吐直視此皆虛冷中風宜餌此

大豆

參升炒令極熟

右以銅器盛清酒伍升沃之密封良久去豆

分爲三服服了覆衣取微汗身才潤即愈產後皆宜服一則防風二乃消血

張仲文療產後中風寒授遍身冷直口噤不識人等方

白朮

肆兩

右酒參升煎取壹升頓服之效

千金雞糞酒療產後中風及男子諸中風并產後百疾神效方

烏雞糞

參升

大豆

貳升

右先炒豆令聲絕次炒雞糞令黃以酒壹升先淋雞糞取汁淋大豆每服一升重者凡四

五日服之極妙

經效療產後風虛頭痛語言時僻

乾葛

防風

伏苓

麥門冬

各捌分

芍藥

黃芩

各陸分

犀角

肆分

甘草

叁兩炙

右水貳升煎取柒合分為兩服

療產後中風心忪悸或志意不定恍惚言語錯亂方

人參

陸分

伏神

麥門冬

羚羊角

各捌分

黃芩

白鮮皮

甘草

各肆兩

石膏

拾貳分

淡竹瀝

兩大合

右水貳大升煎取柒合下竹瀝分爲
療產後中風身背拘急如束并渴

芎藭

芍藥

羌活

羚羊角

酸棗仁

各四兩

桑白皮

陸分

防風

伍分

右水肆升煎取貳升分溫三服

療產後中風四肢拘束筋節掣痛不得轉側如
角弓張

麻黃

捌分去節

生姜

桂心

白朮

各四分

防風

芍藥

各陸分

芎藭

伍分

甜竹瀝

貳合

右水參升先煎麻黃掠去沫下諸藥煎取柒合方下竹瀝更煎三沸食後分三服取微汗為度

療產後中風血氣不散邪氣入藏狂言妄語精神錯亂腰痛骨疼

麻黃

伏神

各捌分

防風

白鮮皮

各陸分

杏仁

當歸

桂

各四分

芍藥

獨活

各伍分

右水貳升伍合煎取玖合空腹熱服

療產後中風身躰疼痛四肢羸弱不遂羌活湯

羌活

芍藥

黃耆

各陸分

乾葛

麻黃

乾地黃 各捌分

甘草

桂心

各四分

右水貳升先煎麻黃去沫後下諸藥取捌合
食後熱服覆衣出汗愈

療產後中風煩渴

紅花子

伍合微熱研碎

右水壹升煎壹匙頭取柒合徐徐呷之

療產後中風口噤四肢頑痺不仁或如角弓張

羌活

防風

各參兩

大豆

壹升炒令皮拆

右酒伍升先浸兩味經宿將炒豆熱投酒中
攪勻密封一日以湯煮瓶良久服捌合覆衣

取汗急速且以豆淋服羌活防風亦佳
療產後中風腰背強直時時反張名風症

防風

葛根

芍藥

乾地黃

各捌分

麻黃

去節

甘草

桂心

獨活

漢防已

各陸兩

杏仁

伍枚去尖

右水捌升煮麻黃去沫後下諸藥煎取叁升
分溫三服

療產後中風口噤潰悶不能言身軀症直

羌活

防風

秦艽

桂心

甘草

葛根

各叁分

生薑

捌分

附子

壹隻炮

杏仁

捌拾枚
去尖

麻黃

拾分去節

右水玖升先煮麻黃去沫後下諸藥取貳升

分為三服

療產後中風口噤拘急困篤腰背強直時及折

大豆

貳升炒令聲絕

右清酒陸升投之煮三四沸去滓飲之令微
醉如汗出差切勿觸風如已成風者加雞糞
白和豆炒同喫兼飲竹瀝佳

△○產後餘血上搶心痛方論第二十四凡六道
論曰夫產後血上搶心由產後氣虛挾宿冷冷

搏於血則凝結不消氣逆上者則血隨上衝擊而心痛也凡產後餘血不尽得冷則結与氣相搏則痛困重遏於寒血結尤甚

乾地黄

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾姜

甘草

各叁兩

細辛

壹兩

右水參升煎取壹升空心分三服忌生冷

經效療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝心滿脹當歸湯

當歸

桂心

芎藭

橘皮

生姜

吳茱萸

各貳兩

芍藥

參兩

右水參升煮取壹升空心服

千金治產後內虛寒氣入腹腹中絞痛下赤白

痢妄經見鬼羊肉湯

甘草

炙

當歸

芍藥

各壹兩

肥羊肉

壹斤去脂

右水陸升先煮肉取貳升去肉入諸藥更煎取壹升分作兩服

千金翼茱萸酒療心腹內外痛

吳茱萸

拾貳分

右酒貳大升煎取壹升空心分兩服

必效療腹中絞刺痛方

羌活

貳大兩

右酒貳升煎取壹升去滓分爲兩服

千金治產後渴少氣

麥門冬

淡竹葉

各拾貳分

大棗

柒枚

生薑

甘草

人參

各陸分

小麥

伍合

右水貳升半煎取壹大升去滓分兩服

△○產後汗不止方論第二十五

凡五道

論曰產後汗不止夫汗由陰虛而得氣加之衷虛表實陽氣發於外故汗出爲陰虛是令汗出

為陰氣虛弱未平復也凡產後皆血氣虛故多汗困遇風邪則變為疾也
千金治產後風虛汗出不止小便難四肢微急難以屈伸

大棗

拾貳枚

附子

桂心

各肆兩

芍藥

捌分

生姜

陸分

右水三升煎取柒合空腹分為兩服忌豬肉

冷水生葱等物

經效療產後汗不止

黃耆

拾二分

白朮

牡蠣

茯苓

防風

乾地黃

麥門冬各捌分 大棗柒枚

右水貳升煎取柒合空心分爲兩服
千金治產後餘疾腹中絞痛不下食瘦乏

當歸 黃耆 芍藥各陸分

乾地黄 白朮各捌分 桂心

甘草各四分 大棗拾四枚

右水貳升煎取捌合空心作兩大服忌生葱

○產後冷熱痢方論第二十六凡二通

療產後驟血不止續命湯

白蜜壹匙頭 生姜壹片

右同煎候蜜色赤投童子小便壹升去姜更

煎兩沸分爲三服頓服之

廣濟治產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微痢

茯苓

人參

當歸

甘草

各六分

生姜

陳橘皮

各四分

厚朴

剉分炙

右水貳升煎取柒合空心分爲兩服忌如前

○產後虛羸方論第二十七

凡三道

論曰產後虛羸者因產損傷腑臟勞侵氣血輕者將養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛羸也

廣濟治產後風虛冷氣腹肚不調補益悅澤

澤蘭

桂心

遠志

厚朴炙

石斛

白止

續斷

防風

乾姜各三分

芎

白朮

柏子仁

黃耆各四分

甘草

當歸各伍分

赤石脂

乾地黄各陸分
人參參分

右擣羅爲末煉蜜爲丸如梧同子大空心酒
下伍拾丸忌如前

桃仁煎療產後百病及諸氣補益悅澤

桃仁

壹斤二伯枚去皮尖炒熟研如膏

右酒壹斗伍升研漚三四遍如作麥粥法以

極細爲佳內長須小瓶中蜜封頭內湯中煮
一日一夜使瓶口常出湯上勿令沒熟後以
酒服一合日再服

千金增減澤蘭丸療產後百病治血補虛勞

澤蘭

防風

甘草

當歸

芳藳

乾姜

麥門冬

各捌分

附子

白朮

白止

桂心

細辛

各肆分

拍子仁

乾地黃

石斛

各陸分

人參

牛膝

各伍分

厚朴

藁本

各貳分

右為末蜜丸梧同子大空心酒下貳拾丸忌
如前

○產後煩渴方論第二十八 凡二道

論曰產後煩渴夫產水血俱下臟腑燥津液不
足宿挾虛熱者燥甚故渴也

經效理產後血氣心煩渴

紫葛 三大兩

右水貳升煎取壹升去滓呷之效

集驗療產後心煩渴

瓜蒌根

人參

甘草

炙各六分

麥門冬 貳分

大棗

棗枚

生地黃

拾二分

右水貳大升煎取捌合食後分爲兩服

○產後煩悶虛熱方論第二十九 凡產道

論曰產後煩悶虛熱夫產即臟腑勞傷血氣傷而風邪乘之搏於血使氣不宣而怫澁則生熱或肢節煩疼口乾但因生熱其煩悶由產後血氣虛弱未復而氣逆乘之故煩悶也其氣故令脇滿妨不下食

生地黃汁 一升 當歸 一兩半 清酒 伍升

生姜汁 三合 童子小便 二升

右相和合煎三四沸分溫四服中間藥消進食食消更進藥

經效理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥

蒲黃

延胡索 各四分

當歸

陸分

荷葉帶

叁枚炙

又方 右水貳升煎柒合後入蒲黃空心服兩服

生藕

右取汁煎兩沸飲兩服效

集驗療產後血氣煩悶

酒貳合

生地黃汁 壹升

右相和煎一兩沸分爲兩服立效

千金療產後血氣喘心煩悶不解

淡竹葉

麥門冬

小麥

茯苓各二分

甘草

生薑各一兩

大棗棗枚

心悸加人參貳兩

食少加粳米貳合

右水貳升煎取柒合食後分為兩服

療產後血下不盡煩悶腹痛

羚羊角炭火上燒作膠二兩 古方燒作灰

芍藥貳兩炒黃枳殼貳兩炒令焦黃色

右搗羅為散水調方寸匕服之

○產後血瘕方論第三十凡四道

論曰產後血斷由新產之後有血氣相搏謂之
痙痛者畜也謂其痛浮痙無定緣內宿有冷血
氣不治至產血下即少故成此疾

童子小便

秦

生藕汁

壹大升

薑汁

壹升

生姜汁

三升

右先煎三味合三分減二次下姜汁慢火煎
如稀錫每取壹合煖酒調服
療血痙痛臍下脹不下食

當歸

剉分

桂心

芍藥

蒲黃

驢竭

各陸分

延胡索

肆分

右為散空心溫酒調下兩錢匕

千金療血瘦

乾地黄

壹兩

烏賊魚骨

貳兩

右爲散空腹溫酒下兩錢匕

又方

鐵秤錘

燒赤

右以酒壹升淬之分爲兩服

○產後餘疾痢膿血方論第三十一 凡八道

論曰產後餘病由產勞傷臟腑不足日月未滿起早勞動虛損不補爲所傷冷氣力瘦乏若風冷入於胃胃傷虛冷生血冷即變白膿膿血相雜冷熱不調爲滯痢也

深師方

黃連 六兩

烏梅 三兩

乾姜 貳兩

右爲末煉蜜爲丸如梧同子大空心米飲下
三十九忌如前

廣濟療產後赤白痢臍腹絞痛

當歸

黃連 各捌兩

艾葉

地榆

甘草 多

龍骨

厚朴

黃芩

乾姜 各六兩

右水貳大升煎取柒合空心分兩服

經效療產後赤白痢臍下氣痛

厚朴 八分

當歸

枳殼

訶子 各六分

甘草 伍分

肉豆蔻 伍枚

右水壹升煎取玖合空心分爲三服

張仲文療產後赤白痢腹中絞痛

黃連

阿膠

炙

蒲黃

各一兩

梔子仁

當歸

黃芩

右爲散空腹米飲下方寸匕日兩服

救急療產後赤白痢腹中絞痛

芍藥

阿膠

艾葉

各二兩

乾地黄

甘草

當歸

各三兩

右水貳升煎取捌合空心分兩服

必效療產後赤白痢腹中絞痛不下食

當歸

石榴皮

地榆

各貳兩

白藜荷

黃連

各拾貳兩

黃檗

壹分

犀角

四兩

黃芩

枳殼

甘草

升麻

各陸分

茜根

捌分

粳米

貳合

薤白

切壹升

右爲末蜜丸如梧同大空心米飲下二十九
療產後血痢小便不通臍腹痛

生馬齒菜

右擣取汁參大合煎一沸下蜜壹合調頓服
千金療產後水痢霍乱下痢無度

白石脂

乾姜

各拾貳分

右爲散麵糊爲丸梧桐子大空心米飲下三十九

△○產後小便赤方論第三十二

凡兩道

論曰產後小便數此由胞內宿有冷因產後冷發動冷氣入腹虛弱不能制其小便即數有遺尿者由產用氣傷於膀胱而冷氣入於胞胞囊決漏不禁小便故令遺失多因產難之所致廣濟療產後小便不禁

鷄屎

燒作灰

右研細空腹酒服方寸匕

千金翼療產後小便數及遺尿

桑螵蛸各拾枚

鹿茸炙

黃耆各叁兩

赤石脂

厚朴炙

牡蠣各二兩

右搗羅爲末空心米飲調下方寸匕忌冷茶毒等物

經效產寶卷之中

經效產寶卷之下

節度隨軍咎殷撰集

相國白帶家藏善本

△○產後小便遺血方論第三十三

凡四道

療產後大小便利血

車前子

黃芩

蒲黃

乾地黃

牡礪

芍藥

各陸分

右為散空心米飲服方寸匕忌麪蒜

崔氏療產後血氣滲入大小腸

車前草

汁壹升蜜壹大合

右相和煎取一沸分為兩服

又小便利血

乱髮燒灰研如粉

右米飲服方寸匕

古今經驗療產後勞傷熱大小便赤澁

雞蘇壹分 通草拾分

冬葵子叁合

芍藥 滑石

芒硝各捌分

生地黃拾貳分

右水參升煮取捌合下芒硝空心分三服

○產後大小便不通方論第三十四凡四道

論曰產後大小便不通腸胃本挾於熱因產大
小便血俱下津液竭燥腸胃痞澁熱氣結於腸

胃故不通也

集驗療產後津液竭燥大小便不通

芍藥

大黃

枳殼

麻仁

研各貳兩

右爲末煉蜜和丸吾同子大空心熟水下貳拾丸漸加之以利爲度

經效療大便不通熱氣結於腸胃

大黃

貳兩

芒硝

壹兩

右水壹大升煎取陸合下芒硝空心作兩服古今錄驗療產後大便不通

黃芩

芒硝

各陸分

大黃

芍藥

杏仁

去皮尖研如膏各捌分

右爲末蜜丸吾同子大空心煎水下拾伍丸
漸加以利爲度

千金療產後熱結大便不通

蜜

伍合火煎令強以水投中良久取出

右捻如母拍大長貳寸內下部即通

○產後寒熱方論第三十五

凡肆道

論曰產後寒熱因產勞傷血氣使陰陽不和反
相乘尅陽勝則熱陰勝則寒陰陽相激故發寒
熱又產餘血亦令人寒熱其腹時痛則是也
療產後虛弱喘乏作寒熱狀如塵名爲辱勞

猪腎

壹具切去膜

豉

伍合綿裹

白梁

貳合

葱白

切壹升

人參

當歸

各壹兩

右水貳升煎取捌合分為兩服

經效療產後虛煩頭痛氣短欲死心乱不解

淡竹茹

乾葛

各捌分

甘草

陸分

麥門冬

子參合

小麥

貳合

石膏

拾貳分

右水貳升煎取捌合食後分為兩服

療產後虛熱煩痛

乾地黄

牡礪

茯苓

各捌分

芍藥

拾貳分

黃芩

桂心

各陸分

右水貳升煎取壹升分為兩服

○產後咳嗽方論第三十六 凡三道

論曰喘嗽肺臟微寒即成喘嗽又因產後氣虛風寒傷於肺故令咳嗽

集驗療產後風傷寒咳嗽多疾唾粘

甘草

桔梗

各陸分

款冬花

肆分

生麥門冬

生地黃

各拾貳分

葱白

壹握

豉

貳合

舊方不入葱白與豉

右水貳升煎取捌合食後良久兩服

經效療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡

五味子

紫苑

貝母

各陸分

桑白皮

茯苓

各捌分

淡竹葉 貳拾片

右水貳升煎取捌合食後分爲兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根

桔梗

各陸分

桑白皮

拾貳分

乾百合

赤茯苓

各捌分

右水貳升煎取柒合食後分兩服

人○產後氣痢方論第三十七

凡陸道

論曰妊娠之時脾胃氣挾於冷大腸氣虛因產後轉加虛損或悞食生冷酒麪便成痢疾赤白氣不和赤黃胃熱或青色極冷也

療產後氣痢不止

青木香

參分

訶子皮

捌分 酥炙令黃

右為散空心米飲調方寸匕服之

療產後赤白痢疾

黃連

捌分

阿膠

炙陸分

赤伏苓

當歸

黃檗

各四分

乾姜

參分

右為末蜜丸如梧桐子大空心粥飲二十九

療產後水痢

枳殼

肆分

厚朴

炙

伏苓

黃連

各陸分

當歸

參分

右水壹升煎取捌合空心分為三服

又方

黃連

陸分

烏梅肉

伍分

石榴皮

當歸

赤石脂

各四分

乾姜

參分

右爲末蜜丸梧桐子大空心米飲下三十九
療產後下痢赤白有血

赤石脂

黃連

地榆

各陸分

當歸

肆分

乾姜

甘草

各參分

厚朴

拾貳分

薤白

柒莖

右水貳升煎取捌合空心分兩服
療產後血痢不止

臭樗根

陸分

右爲末水和丸如棗核大麪杵作餛飩每度

黃二七個熟吞之

△○產後血暈悶絕方論第三十八

凡十道

論曰產後血暈者其狀心煩氣欲絕是也亦有用心過多而暈亦有下血極少亦暈若下血多暈者但煩而已下血少而氣逆者則血隨氣上撩心下滿急此二者難並爲暈而狀候各異常問其產婦血下多少即知須速投方藥若不急療即危其命也凡暈者熱血氣乘虛奔逆上所致也但才分解了燒秤鎰江石令赤置器中向產母床前帳裏投醋淬之得醋氣可除血暈之法也十日內時時作此法不妨暈者如日月之

有暈也

經效產後虛悶汗出不識人

鷄子參不

右打破吞之便醒不醒者可灌童子小便入腹即醒若久不醒忽時時發者此為有風因產血氣暴風虛風行脉中若虛去血多者尤甚也

產後血氣暴虛汗出

淡竹葉

右煎湯參合微溫服之須臾再服

又方

馬齒菜

研取汁參大合如無用乾者亦得

右煎一沸投蜜壹匙令勻頓服

廣濟療產後血暈心悶不識人神言鬼語氣息欲絕

芍藥

甘草

各壹兩

生地黃

汁壹升

丹參

肆分

生薑汁

蜜

各壹合

右水貳升煎取捌合下地黃姜蜜汁分兩服療產後惡露不多下腹絞痛

大黃

捌分

牛膝

陸分

芍藥

蒲黃

各四分

牡丹皮

當歸

各貳分

右為末空心煖酒服方寸匕

救急療產後血不盡疼悶心痛

荷葉炒令香

右爲散煎水調方寸匕服

療初平安血氣煩悶

童子小便

伍合

生地黃汁

叁合

右煎三沸溫再服

療產後血暈心悶

蒲黃

肆分

紫葛

芍藥

各捌分

紅藍花

拾貳分

右水貳升煎取柒合入生地黃汁貳合更煎三五沸每服三合

產後血暈心悶恍惚如見鬼

生益母草

汁叁合根亦得

地黃汁貳合

小便壹合

鷄子

叁枚取清

右煎三四沸後入雞子清勻攪作一服

產後血暈狂語不識人狂亂

童子小便伍合

地黃汁壹合

赤馬通

柒枚

紅雪

捌分

右以上貳味浸馬通絞去滓下紅雪溫兩服

○產後乳無汁方論第三十九

凡五道

論曰氣血虛弱經絡不調所致也乳汁勿投於地虫蟻食之令乳無汁可沃東壁上佳

療產後乳無汁

土瓜根

漏蘆

各叁兩

甘草

貳兩

通草

肆兩

右水捌升煎取兩升分溫叁服忌如常法

又方

土瓜根

右爲末酒調兩錢匕日進二三服效

又方

母猪蹄

兩枚切

通草

陸兩

右以綿裹煮作羹食之最好

又方

漏蘆

通草

土瓜根各叁兩

甘草

桂心

各壹兩

右爲散飲服方寸匕日進叁服

又方

括蔞末

右以井花水服方寸匕日兩服夜流出

△○產後乳結癰方論第四十凡十九道

論曰產後宜裂去乳汁不宜畜積不出惡汁內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其姪手近不得若成膿者名妬乳乃急於癰宜服連翹湯利下熱毒外以赤小豆末水調塗之便愈

忽數担去乳汁忽小兒手勻動之忽大人含水
啣之得汁吐之其汁狀如膿若產後不曾乳兒
畜積乳汁亦結成癰
療產後妬乳并癰

連翹子

升麻

芒硝

各拾分

玄參

芍藥

白欬

漢防已

夜干

各捌分

大黃

拾貳分

甘草

陸分

杏仁

捌拾枚去尖

右水九升煎取參升下大黃次下硝分參服

又方

蒲黃草

右熟搗傳腫上日參度易之并葉煎汁飲之
亦佳食之亦得胎乳及癰並差

又方

地黃

右取汁塗熟即差

療乳腫

右以馬溺塗之立愈

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血後虛成氣疾

黃耆

地黃

麥門冬

升麻

人參

伏苓

各參兩

當歸

芍藥

遠志

甘草

各壹兩

大棗

拾枚

右水貳升煮取壹升分溫兩服

療乳頭裂破

右以丁香爲末傅之立愈

療妬乳及癰

葵莖及子

右擣篩爲散服方寸匕即愈

又方

雞屎

右爲末服方寸匕須臾三服愈

又方

皂莢 拾條

右以酒壹升採取汁硝石半兩煎成膏傳之
療諸癰不散已成膿懼針令自決破下

右取白雞內翅及第一翎各壹莖燒末服之
即決

又方

取雄雀糞白者研塗上乾即易之
療乳癰初得令消

赤小豆 茵草

右等分爲末苦酒和傳之愈

療發背乳癰四肢虛熱大渴

竹葉

切參升以水壹斗貳升煮取九升

生地黃

陸兩

黃芩

芍藥

人參

知母

甘草

各貳兩

升麻

黃耆

麥門冬

括藹

各參兩

大棗

拾貳枚

右以竹葉汁煮取參升渴則飲之

療乳腫方

升麻

白欬

大黃

各參兩

黃芩

芒硝

各貳兩

右水貳升煎取壹升下硝分為兩服後以綿
緇藥帖腫上日夜勿停即差

又方

黃蘗

壹分末

鷄子白

右調和勻塗之乾則易立愈

又方

苧根

右擣傳之愈

又方

鹿角

右於石上磨取濁汁塗上乾即易之

又方

鹿角

右燒作灰以酒調塗之立愈

又方

粢米粉炒令黑

右以鷄子白和如泥以塗帛上貼之穿帛作
穴以泄癰毒氣易之效

八〇產後乳汁自出方論第四十一凡三道

論曰產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥
以止之若乳多溫滿急痛者溫熨之

療乳癰始作

大黃

樗實各參兩

芍藥陸分

馬蹄多陸分

經效產寶續編

○周頌傳授濟急方論 凡四道

頌嘗見人傳經效諸方自曾修合實有大功遂編於卷末普用傳授以濟急難

治產後血暈血氣及滯血不散便成癥瘕兼瀉面色黃腫嘔逆惡心頭痛目眩口吐清水四肢羸弱五臟虛怯常日睡多喫食減少漸成羸瘦年久變為勞疾如此所患偏宜服餌勝金丸

澤蘭 四兩

當歸

為藥

羌活

甘草

營藟 各陸分

乾姜

桂心 各參分半

石膏

桔梗

細辛

茱萸

栝子仁

防風

厚朴

烏頭

白微

枳殼

南椒

金釵石斛

石鍾

蒲黃

伏苓各參分

白朮

白芷

人參

藁本

青木香各壹分

右二十八味並州土分兩无差杵羅爲末煉蜜爲丸彈子大有所患熱酒研壹丸入口便愈大忌腥膩熱麵豉汁生葱冷水菓子等若死胎不下胎衣在腹並以炒鹽酒研服未退

再服

治產後諸疾聖散子

澤蘭

致分

石膏

捌分如粉

營龍

當歸

芫荽

芍藥

甘草

各柒分

乾姜

桂心

各伍分

細辛

卷栢

去土

栢子仁

茱萸

防風

去芦頭

南椒

出汗

厚朴

姜汁炙

茯苓

各四分

白芷

白朮

人參

丹參

藁本

五味子

黃耆

各叁分

烏頭

炮

白微

各貳分

右擣羅爲散以新瓦器密封无令失氣每服以熱酒調下兩錢匕忌如常

神效治產後一切疾黑散子

鯉魚皮

參兩燒灰

芍藥

蒲黃

各貳兩

當歸

沒藥

桂心

好墨

卷栢

青木香

麝香

各壹兩

銚墨

半兩

丈夫髮

灰半兩

右一十二味擣羅爲散以新瓦器盛密封勿令失氣每產後以好酒調下壹錢匕如血暈衝心下血不尽臍下撓刺疼痛不可忍塊血癥疾甚日加兩服不拘時候服忌冷物果子

粘食

神效療妊娠十個月內不安至臨分解時並宜服此保生丸

金釵石斛

貝母去心

黃芩

明淨石膏

細研如粉

桂心

烏頭卷

秦椒去目炒

蜀椒

去目炒

甘草

糯米

炒已上各貳兩

右並涇州上者如法修合爲散煉蜜丸如彈子大或有妊娠諸疾喫食減少及氣喘疾痛面目萎黃身軀羸瘦四肢無力手脚浮腫胎臟不安並以棗湯研壹丸服氣痛酒研壹丸

空心服之忌腥膩果子粘食雜物冷肉等

○濮陽李師聖施郭替中論 二十一證方十六道

第一論

熱病死胎腹中者如何

荅曰母患熱疾至六七日以致藏府熱極蒸
煮其胎是以致死緣兒死身冷不能自出但
服黑神散暖其胎須臾胎氣溫暖兒即自出
何以知其死看產婦舌色青者是其驗宜以
黑神散主之

雄黑豆

小者是妙去黑皮用貳兩

當歸

芍藥

甘草

炙

乾姜

蒲黃

用安石器內炒赤色

肉桂

熟地黃

溫水洗

右等分焙干爲末每服貳錢空心溫酒調下
若三十歲已上生產少者不用桂姜却以炒
生薑紅花各貳兩

第二論

胎衣不下者如何

荅曰母生子了血流入衣中爲血所脹遂不
能下若治之稍緩則滿腹中上衝心胃疼痛
喘急難治但服奪命丹速去衣中血血散脹
消胎衣自下而無所患矣奪命丹

附子

半兩炮去皮脐

牡丹皮

壹兩

干漆

壹分研碎炒令煙出

右為末用醞醋壹升大黃末壹兩熱成膏和藥丸如菉豆大溫酒送下五七丸不計時候

第三論

難產者如何

荅曰胎側則成形塊者呼為兒枕子欲生時枕破敗血裹其子故難產但服勝金散治之逐其敗血兒即自生若橫生逆生皆治之

射香

壹錢

鹽豉

壹兩用舊青布裹火燒令通紅急以乳搥研為細末

右為末取秤搥燒紅以酒淬之每服調壹錢

第四論

悶絕不知人事者如何

荅曰產後血氣暴虛未得安靜血隨氣上攻
迷亂心神眼前生花極甚者令人悶絕不知
人事口噤神昏氣冷醫者不識呼爲暗風若
如此治之必難愈宜服清菟散

澤蘭葉

壹分

人參

壹錢

荊芥穗

壹兩

芎

半兩

甘草

貳分炙

右爲末每服壹錢熱湯半盞入溫酒半盞調
勻急嚥之藥下便愈

第五論

口干痞悶者如何

青 五
荅曰產宮胃太虛血氣未定食麪太早胃不
能消化麪毒結聚於胃脘上薰胃中是以口
干煩渴心下痞悶醫者不識認爲胃膈壅滯
以藥下之萬不能一但服眼兒現丸

姜黃

京三稜

炮

畢澄茄

人參

陳皮

去白

高良姜

蓬莪朮

右等分爲末用細切蘿蔔慢火煮令爛研細
將餘汁煮麪糊爲丸黍豆大每服拾丸蘿蔔
湯下不拘時候

第六論

產後乍寒乍熱如何

答曰陰陽不和敗血不散皆作乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或熱若因產勞傷藏府血弱不能寬越故敗血不散入肺即熱入脾即寒醫人若作寒瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜服增減四物湯敗血不散宜服奪命丹

又問二者何以別之

答曰時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增減四物湯

當歸

芍藥

芎

人參

干姜

炮裂各
貳兩

甘草

四兩炙

右爲末每服貳錢水壹盞生薑五片同煎至
陸分去滓微熱服不計時候

第七論

產後四肢虛腫者如何

荅曰產後敗血乘虛停積於五藏循經流入
四肢留滯入深回還不得腐壞如水故令四
肢面目浮腫醫者不辨作氣治之凡水氣多
用導水藥極虛之夫產後既虛又以藥虛之
是重虛也但服調經散血行腫消則病自愈

沒藥

壹錢研

琥珀

壹錢研

桂

去麋皮半錢

芍藥 壹錢

當歸 壹錢

麝香 半錢

細辛 半錢

右爲末每服半錢生姜汁溫酒各少許調勻服之

第八論

產後不語者如何

荅曰人心有七孔三毛產後血流氣弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉則舌亦強矣故令不語但服七珍散

人參

石菖蒲

川芎

熟地黃

各壹兩

細辛

壹錢

防風

半兩

朱砂

半兩研

右爲末每服壹錢薄荷湯調下不拘時候

第九論

產後乍見鬼神者如何

荅曰心主身之血脉因產傷耗血脉心氣則虛血停積上干於心受獨激遂生煩燥坐卧不安乍見鬼神言語顛錯醫者不識呼爲風邪如此治之必不能愈但服調經散加生龍腦一捻得睡即安調經散方在第七論中

第十論

產後腹痛又瀉痢者如何

荅曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風則寒邪乘虛進襲留於胃腹散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白腹脇填脹或走痛不定急服調中湯立愈醫者若以爲積滯取之則禍不旋踵矣

高良姜

當歸

桂去皮

芍藥

附子

炮去皮臍

川芎

各壹兩

甘草

半兩炙

右爲粗末每服參錢水參芩煎至壹盞去滓

熱服

第十一論

產後遍身疼痛者如何

答曰產後百節開張血脉流走遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脉引急故腰背轉側不得手足搖動不得更身熱疼痛醫者以爲傷寒治之若出汗則筋脉動惕手足厥冷變生他病但服趁痛丸以墨塗之

牛膝

當歸

桂去皮

白朮

黃耆各半兩

薤白壹分

獨活 半兩

生薑 半兩

甘草 壹錢炙

右爲粗末每服半兩水五盞煎至貳盞去滓
熱服壹盞

第十二論

產後大便秘澁者如何

荅曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足故
大便秘澁若過五六日腹中悶痛者乃有燥
糞在藏府以其乾澁不能出耳宜服麻仁丸
更以津潤之若誤以爲熱而投寒藥則陽消
陰長變動百生性命危矣麻仁丸

麻仁 研

枳殼 炒

人參

生薑 半兩

右爲粗末水兩盞煎至壹盞去滓微熱服分爲三服

第十五論

產後口鼻黑氣起及鼻衄如何

荅曰陽明者經絡之海起於鼻交頰中還出俠口交人中之左右是蓋因夫產後氣消血散榮衛不理散亂入諸經絡回還不得致令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後諸虛熱變生此疾不可治也名曰脾絕肺散

第十六論

喉中氣急喘者如何

答曰榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產後下血過多榮衛暴竭氣无所生獨聚於肺中故令喘也此名孤陽絕陰爲難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘急可服奪命丹方見前第二論中

第十七論

產後中風者如何

答曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或懷憂悲怒擾蕩洩和氣或因着

灸驚場藏府得疾之物眼澁口噤肌肉相搖
腰脊筋急強直者不可治此乃人作非偶尔
中風所得也

第十八論

產後心痛者如何

荅曰心者血脉之主人有挾宿寒因產大虛
寒搏於血血凝滯不得消散其氣逆上衝擊
於心經故心痛宜以大品蜜湯治寒則去血
脉溫則經絡通心痛自止若誤以爲有所傷
治之則虛極而寒益甚矣心絡寒甚傳心之
正經則變成心痛者朝發則夕死是藥不可

輕用也

乾地黄

當歸

獨活

吳茱萸

芍藥

乾姜

炮

甘草

炙各壹兩

細辛

半兩

桂

壹兩去麋皮

少草

壹兩遠志葉是也

右爲粗末每服半兩用水叁大盞煎取壹盞
去滓微熱

第十九論

產後熱悶氣上轉爲脚氣者如何

答曰產後卧血虛生熱復因春夏取涼過多
地之蒸濕因足履之所以着成脚氣其狀熱

悶掣發驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也服小續命湯三兩劑必愈若誤以敗血藥攻之則血去而病益增矣

人參

黃芩

官桂

去皮

白朮

防己

麻黃

去節

川芎

芍藥

甘草

各壹兩

生薑

五兩

防風

兩半

附子

壹枚去皮

右爲末每服半兩用水五盞煎去滓溫服

第二十論

產後出汗多而變瘧風如何

答曰產後血虛內理不密故多汗因遇風邪

搏之則變瘕風也瘕者口噤不開背強而直如發癰狀搖頭馬鳴身反折須臾十發息如絕宜速斡開口灌小續命湯稍暖即出汗如雨手拭不及者不治

第二十一論

產後下血過多虛極熱生風如何

荅曰婦人以榮血為主因產血下太多氣无所主唇青肉冷汗出目瞑神昏命在須臾此皆虛熱非風也可服濟危上丹若以風藥治之則誤人矣

乳香

研

石靈脂

留黃

研

陳皮去白

桑寄生

真阿膠

炙洋炒成米子

太陰玄精石研

右將上四件同研勻石器內微火上炒動勿令焦着炒了再研細後入餘藥末用地黃汁煮糊為丸菴豆大每服酒下二十九當歸酒尤佳

○產後十八論方凡九道

一曰產後因熱病胎死腹內者如何

答曰蓋因母患熱病經六七月間藏府熱遂黃其胎熱是致死故知之緣死即身熱痛只用沫出瓜甲拍黑四肢逆冷但服烏金散其

胎即下

二曰產難者如何

荅曰蓋其胎以或成形為食實物後十月足日食有餘遂有成塊呼為兒枕欲生時塊破遂血裹其子故難產但服烏金散解其敗血即自生或橫生逆生不下並宜服之

三曰產後衣不下者如何

荅曰母生子了產後血入衣中被血所脹故當難下但服烏金散去其衣中血即下如帶斷亦同

四曰血暈者如何

答曰產後三日起坐不得眼前生花即運走五藏流入汗血醫人不識呼為暗風但可服烏金散

五曰口乾心悶者如何

答曰產後七日已來血氣未盡蓋為母食麪結盛心上是以煩燥乾渴醫人不識將謂胃膈不利壅滯所致烏金散立效

六曰乍寒乍熱者如何

答曰產後虛羸敗血入於肺臟即熱即寒醫人不識呼為瘧疾誤矣宜服烏金散立效

七曰產後虛腫者如何

荅曰血敗於五藏流入四肢即還不得遂成膿血醫人不識呼爲水氣血氣何以知之若水氣喘而小腸澁血氣傷而四肢寒但服烏金散姜酒調下須臾服朱砂丸令瀉下毒物即愈

八曰乍見鬼神者如何

荅曰敗血流入於心心不受觸遂被心熱極燥三兩日言語顛狂醫人不識呼爲風邪太誤宜服烏金散療之

九曰產後月內不語如何

荅曰人心有孔孔內有毛產後敗血閉毛故

不語也宜服烏金散

十曰腹內疼痛兼瀉痢者如何

荅曰產後未滿月飲冷水與血相聚大腸水穀不化或腹脹痛急服烏金散更加服氣藥止瀉藥

十一曰產後遍身疼痛者如何

荅曰產後百節開張敗血走流諸處留停日久不散結聚成此疼痛宜服烏金散有效

十二曰產後血崩者如何

荅曰產後敗血惡露自下未止間早先治之及食鹹酸之物遍躰无血色腹痛難治肝家

欲發寒熱作悶宜服烏金散須服朱砂元

十三曰產後血氣不通咳嗽者如何

荅曰產後咳嗽多以食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時充心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩燥睡夢驚悸氣虛肢躄无力宜服烏金散

十四曰產後乍寒乍熱心痛月候不來如何

荅曰敗血充心痛達臍腹面色无采縱然得效暫時痊安不過三兩日又發服烏金散大效

十五曰產後腹脹滿嘔逆不定者如何

荅曰敗血停於脾胃食充胃胃充氣既不安
即吐逆充腹脹急服烏金散次服朱砂丸三
兩日炒生姜錢醋湯下七丸立效

十六曰產後口鼻黑氣及鼻衄者如何

荅曰敗血入臟腑頭目却還不得口乾舌焦
鼻黑起是產後變作此候名曰敗肺此不可
治療

十七曰產後喉中氣喘急者何如

荅曰產後敗血不尽冷惡死血上衝心過於
心即傳於喉喉中即喘醫人不識認作風涎
十死不治

十八曰產後中風者如何

荅曰產後七日无故下床一月之內不傷房室或因着熱有驚臟腑風中之物眼眩腰疼似角弓之反張牙關閉急宜治之亦非風疾所致也

烏金散

乾地黄

熟水浸

肉桂

去皮

蒲黃

紙銚炒已上各貳兩

黑豆

炒盡煙為炭秤貳兩

當歸

洗

芍藥

甘草

炙

白姜

炮已上各壹兩

右為末空心日午夜中熱酒下兩錢匕忌生冷一切毒物

朱砂丸治產後

積結成諸疾

黑附子

炮去皮
剉半兩

肉桂

半兩
去皮

白姜

半兩炒

川巴豆

壹錢醋浸煮去皮研

右細研麪糊爲丸麻子大每服三丸至五丸
冷茶下服之取瀉爲度

治產後胎衣不下

鷄子白

壹个

滑石末

兩錢

右攤頭急流水調下立出

治孕婦傷寒

柴胡

前胡

川芎

川當歸

地黃

人參

芍藥

粉草

右等分爲末每服兩錢棗四枚姜錢三片同煎服要出汗加葱

治孕婦傷寒涎嗽

知母

杏仁去皮尖炒

天門冬去心

桑白皮

右等分爲粗末煎去滓服

治婦人帶下黃君正方

茅花壹握炒

椶櫚炭參寸

嫩蓮葉參个

甘草節

右爲末